

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 12 हैं ।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें ।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 30 प्रश्न हैं ।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें ।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।
- Please check that this question paper contains 12 printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 30 questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

## रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक)

### CHEMISTRY (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks : 70

## QB365-Question Bank Software

सामान्य निर्देश :

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (ii) प्रश्न-संख्या 1 से 8 तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है ।
- (iii) प्रश्न-संख्या 9 से 18 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं ।
- (iv) प्रश्न-संख्या 19 से 27 तक भी लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक हैं ।
- (v) प्रश्न-संख्या 28 से 30 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक हैं ।
- (vi) आवश्यकतानुसार लॉग टेबलों का प्रयोग करें । कैल्कुलेटर्स के उपयोग की अनुमति नहीं है ।

**General Instructions :**

- (i) *All questions are compulsory.*
- (ii) *Questions number 1 to 8 are very short-answer questions and carry 1 mark each.*
- (iii) *Questions number 9 to 18 are short-answer questions and carry 2 marks each.*
- (iv) *Questions number 19 to 27 are also short-answer questions and carry 3 marks each.*
- (v) *Questions number 28 to 30 are long-answer questions and carry 5 marks each.*
- (vi) *Use Log Tables, if necessary. Use of calculators is **not** allowed.*

1. NaCl किस प्रकार का स्टॉइकियोमीट्री दोष दर्शाता है ? 1  
What type of stoichiometric defect is shown by NaCl ?
2. 'इमल्शन' (emulsions) को परिभाषित कीजिए । 1  
Define 'Emulsions'.
3. XeF<sub>4</sub> की संरचना आरेखित कीजिए । 1  
Draw the structure of XeF<sub>4</sub>.

4. ऐलुमिनियम के निष्कर्षण में विशुद्ध ऐलुमिना ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) प्राप्त करने में  $\text{CO}_2$  द्वारा क्या भूमिका अदा की जाती है ? 1  
What role is played by  $\text{CO}_2$  in getting pure alumina ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) in the extraction of aluminium ?
5. 2-ब्रोमोपेन्टेन की संरचना आरेखित कीजिए । 1  
Draw the structure of 2-bromopentane.
6. संक्रमण तत्त्व परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएँ क्यों दर्शाते हैं ? 1  
Why do transition elements show variable oxidation states ?
7.  $\text{CH}_3 - \text{NH}_2$  और  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$  में से, किस एक का क्वथनांक अधिक है ? 1  
Out of  $\text{CH}_3 - \text{NH}_2$  and  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ , which one has higher boiling point ?
8. निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखिए : 1  
$$\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CHO}$$
  
Write the IUPAC name of the following compound :
- $$\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CHO}$$
9. एक विलयन की मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए । विलयन की मोललता मान को मोलरता मान में हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं ? 2  
Differentiate between molarity and molality of a solution. How can we change molality value of a solution into molarity value ?
10. (a) एक अभिक्रिया,  $\text{A} + \text{B} \rightarrow$  उत्पाद, के लिए वेग नियम,  $\text{Rate} = k[\text{A}]^1 [\text{B}]^2$  से दिया गया है । अभिक्रिया की कोटि क्या है ? 2  
(b) प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक 'k' की इकाई लिखिए ।  
(a) For a reaction,  $\text{A} + \text{B} \rightarrow$  Product, the rate law is given by,  $\text{Rate} = k[\text{A}]^1 [\text{B}]^2$ . What is the order of the reaction ?  
(b) Write the unit of rate constant 'k' for the first order reaction.

11. निम्न प्रक्रमों के पीछे जो सिद्धान्त निहित होते हैं उनका वर्णन कीजिए : 2
- (i) अयस्कों के सांद्रण में झाग प्लवन प्रक्रम  
(ii) धातुओं का वाष्प प्रावस्था परिष्करण
- Describe underlying principles of the following processes :
- (i) Froth floatation process of concentration of ores  
(ii) Vapour phase refining of metals
12. निम्न यौगिकों की संरचनाएँ आरेखित कीजिए : 2
- (i)  $H_2SO_3$   
(ii)  $N_2O_5$
- Draw the structures of the following compounds :
- (i)  $H_2SO_3$   
(ii)  $N_2O_5$
13. निम्नलिखित प्रत्येक अवलोकन के लिए उपयुक्त कारण लिखिए : 2
- (i) संक्रमण धातुएँ (Zn, Cd और Hg को छोड़कर) ठोस (कठोर) और उच्च गलनांक और क्वथनांक वाली होती हैं ।  
(ii) संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी में आयनन एन्थैल्पियाँ (प्रथम और द्वितीय) अनियमित रूप से परिवर्तित होती हैं ।

**अथवा**

लैन्थेनॉयड संकुचन क्या है ? लैन्थेनॉयड संकुचन का एक परिणाम दीजिए ।

Assign a reason for each of the following observations :

- (i) The transition metals (with the exception of Zn, Cd and Hg) are hard and have high melting and boiling points.  
(ii) The ionisation enthalpies (first and second) in the first series of the transition elements are found to vary irregularly.

**OR**

What is lanthanoid contraction ? Write a consequence of lanthanoid contraction.

14. निम्न में से प्रत्येक के लिए कारण लिखिए : 2

- (i) संक्रमण तत्त्व अनुचुम्बकीय गुण दिखाते हैं ।
- (ii)  $\text{Co}^{2+}$  सरलता से प्रबल लिगेण्ड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है ।

Assign reason for each of the following :

- (i) Transition elements exhibit paramagnetic behaviour.
- (ii)  $\text{Co}^{2+}$  is easily oxidised in the presence of a strong ligand.

15. ग्लूकोस की उन अभिक्रियाओं का विवरण दीजिए जिन्हें इसकी खुली शृंखला संरचनाओं द्वारा नहीं समझाया जा सकता है । 2

Enumerate the reactions of glucose which cannot be explained by its open chain structures.

16. निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए : 2

- (i) विलियमसन ईथर संश्लेषण
- (ii) कोल्बे अभिक्रिया

Write the equations involved in the following reactions :

- (i) Williamson ether synthesis
- (ii) Kolbe's reaction

17. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 2

- (i) विटामिन A और विटामिन C हमारे लिए क्यों अत्यावश्यक हैं ?
- (ii) न्यूक्लिओसाइड और न्यूक्लिओटाइड में क्या अंतर होता है ?

Answer the following questions :

- (i) Why are vitamin A and vitamin C essential for us ?
- (ii) What is the difference between a nucleoside and a nucleotide ?

18. निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है ? 2

- (i) प्रोपीन से प्रोपेन-2-ऑल
- (ii) एथिल क्लोराइड से एथानल

How are the following conversions carried out ?

- (i) Propene to Propan-2-ol
- (ii) Ethyl chloride to Ethanal

**QB365-Question Bank Software**

19. एक अभिक्रिया में हाइड्रोजन पEROक्साइड,  $\text{H}_2\text{O}_2$  (जलीय),  $\text{H}_2\text{O}$  (l) और  $\text{O}_2$  (g) में अपघटित होता है। अभिक्रिया  $\text{H}_2\text{O}_2$  में प्रथम कोटि की है और वेग नियतांक  $k = 1.06 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$  है।

(i)  $\text{H}_2\text{O}_2$  के एक प्रतिदर्श के 15% को अपघटित होने में कितना समय लगेगा ?

(ii) प्रतिदर्श के 85% को अपघटित होने में कितना समय लगेगा ?

3

Hydrogen peroxide,  $\text{H}_2\text{O}_2$  (aq) decomposes to  $\text{H}_2\text{O}$  (l) and  $\text{O}_2$  (g) in a reaction that is first order in  $\text{H}_2\text{O}_2$  and has a rate constant  $k = 1.06 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$ .

(i) How long will it take for 15% of a sample of  $\text{H}_2\text{O}_2$  to decompose ?

(ii) How long will it take for 85% of the sample to decompose ?

20. 5 kg जल के साथ कुछ एथिलीन ग्लाइकोल,  $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ , आपकी कार की शीतलन प्रणाली में डाला जाता है। यदि जल-ग्लाइकोल विलयन का हिमांक  $-15.0^\circ\text{C}$  हो, तो विलयन का क्वथनांक क्या होगा ?

(जल के लिए  $K_b = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$  और  $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ )

3

Some ethylene glycol,  $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ , is added to your car's cooling system along with 5 kg of water. If the freezing point of water-glycol solution is  $-15.0^\circ\text{C}$ , what is the boiling point of the solution ?

( $K_b = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$  and  $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$  for water)

21. कॉपर का घनत्व  $8.95 \text{ g cm}^{-3}$  है। इसके क्रिस्टल की फलक केन्द्रित घनीय संरचना होती है। कॉपर परमाणु की त्रिज्या क्या है ?

(परमाणु द्रव्यमान  $\text{Cu} = 63.5 \text{ g mol}^{-1}$ ,  $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ )

3

The density of copper is  $8.95 \text{ g cm}^{-3}$ . It has a face centred cubic structure. What is the radius of copper atom ?

(Atomic mass  $\text{Cu} = 63.5 \text{ g mol}^{-1}$ ,  $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ )

22. निम्न पदों की परिभाषा दीजिए :

3

(i) शोषण

(ii) टिण्डल प्रभाव

(iii) इलेक्ट्रोफोरेसिस

Define the following terms :

- (i) Sorption
- (ii) Tyndall effect
- (iii) Electrophoresis

23. निम्न को कारण देते हुए समझाइए :

3

- (i) ऐनिलीन फ्रीडेल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया नहीं देता है ।
- (ii) एथिलऐमीन जल में घुलनशील है परन्तु ऐनिलीन नहीं ।
- (iii) मेथिलऐमीन के  $pK_b$  का मान ऐनिलीन के  $pK_b$  मान से कम है ।



Account for the following :

- (i) Aniline does not give Friedel-Crafts reaction.
- (ii) Ethylamine is soluble in water whereas aniline is not .
- (iii)  $pK_b$  of methylamine is less than that of aniline.

24. (a) निम्न युग्मों में से कौन-सा यौगिक  $-OH$  समूह धारक यौगिक के साथ  $S_N2$  अभिक्रिया करने में अधिक तेजी से अभिक्रिया करेगा ?

- (i)  $CH_3Br$  या  $CH_3I$
- (ii)  $(CH_3)_3CCl$  या  $CH_3Cl$

(b) निम्न अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए :





3

(a) Which compound in each of the following pairs will react faster in  $S_N2$  reaction with  $-OH$  group ?

- (i)  $CH_3Br$  or  $CH_3I$
- (ii)  $(CH_3)_3CCl$  or  $CH_3Cl$

(b) Write the product of the following reactions :




25. निम्न कॉम्प्लेक्सों में से प्रत्येक का आई.यू.पी.ए.सी. (IUPAC) नाम लिखिए :

3

- (i)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$
- (ii)  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
- (iii)  $[\text{NiCl}_4]^{2-}$

अथवा

निम्न कॉम्प्लेक्स आयनों में से प्रत्येक के प्रकाशिक समावयवियों की संरचनाएँ आरेखित कीजिए :




Write down the IUPAC name for each of the following complexes :

- (i)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$
- (ii)  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
- (iii)  $[\text{NiCl}_4]^{2-}$

OR

Draw the structures of optical isomers of each of the following complex ions :



26. निम्नलिखित क्या हैं ? प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दीजिए ।

3

- (i) मधुरकारी कर्मक (स्वीटनिंग एजेंट)
- (ii) खाद्य परिरक्षक
- (iii) प्रतिजैविक

What are the following ? Give one example of each.

- (i) Sweetening agents
- (ii) Food preservatives
- (iii) Antibiotics



27. निम्न बहुलकों के एकलकों के नाम दीजिए :

3

- (i) निओप्रीन
- (ii) पॉलिस्टाइरीन
- (iii) पॉलिप्रोपीन

Give names of the monomers of the following polymers :

- (i) Neoprene
- (ii) Polystyrene
- (iii) Polypropene

28. (a) एक विद्युत्-अपघट्य के विलयन के लिए चालकता और मोलर चालकता पदों को परिभाषित कीजिए। तापमान बदलने के साथ उनके परिवर्तन पर टिप्पणी कीजिए।

- (b) एक चालकता सेल का मापित प्रतिरोध 100 ohm था। परिकल्पित कीजिए  
(i) विशिष्ट चालकता और (ii) विलयन की मोलर चालकता।  
(KCl = 74.5 g mol<sup>-1</sup> और सेल स्थिरांक = 1.25 cm<sup>-1</sup>)

2, 3

अथवा

(a) निम्नलिखित प्रत्येक में विद्युत्-अपघटन के उत्पादों की प्रागुक्ति कीजिए :

- (i) प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO<sub>3</sub> का जलीय विलयन।
- (ii) प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> का जलीय विलयन।

(b) उस न्यूनतम विभवांतर का आकलन कीजिए जो 500°C पर Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> का अपचयन करने के लिए आवश्यक है। अपघटन अभिक्रिया  $\frac{2}{3} Al_2O_3 \rightarrow \frac{4}{3} Al + O_2$  के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है 960 kJ। (F = 96500 C mol<sup>-1</sup>)

(a) Define the terms conductivity and molar conductivity for the solution of an electrolyte. Comment on their variation with temperature.

(b) The measured resistance of a conductance cell was 100 ohms. Calculate (i) the specific conductance and (ii) the molar conductance of the solution.

(KCl = 74.5 g mol<sup>-1</sup> and cell constant = 1.25 cm<sup>-1</sup>)

OR

- (a) Predict the products of electrolysis in each of the following :
- An aqueous solution of  $\text{AgNO}_3$  with platinum electrodes.
  - An aqueous solution of  $\text{H}_2\text{SO}_4$  with platinum electrodes.
- (b) Estimate the minimum potential difference needed to reduce  $\text{Al}_2\text{O}_3$  at  $500^\circ\text{C}$ . The Gibbs energy change for the decomposition reaction  $\frac{2}{3} \text{Al}_2\text{O}_3 \rightarrow \frac{4}{3} \text{Al} + \text{O}_2$  is 960 kJ. ( $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$ )

29. (a) निम्न का वर्णन कीजिए :
- ऐल्डोल संघनन
  - कैनिज़ारो अभिक्रिया
- (b) निम्न युग्मों में अंतर करने के लिए रासायनिक जाँच का वर्णन कीजिए :
- एथैनैल और प्रोपैनैल
  - बेन्ज़ैल्डिहाइड और ऐसीटोफीनोन
  - प्रोपेन-2-ओन और प्रोपेन-3-ओन

2, 3

अथवा

- (a) निम्न यौगिकों की संरचनाएँ आरेखित कीजिए :
- 4-क्लोरोपेन्टेन-2-ओन
  - ब्यूट-2-ईन-1-अल
- (b) निम्नलिखित में उत्पाद लिखिए :
- $\text{CH}_3 - \text{COOH} \xrightarrow{\text{Br}_2/\text{P}} ?$
  - $\text{CH}_3 - \text{CHO} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4} ?$
  - $\text{CH}_3 - \underset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}} - \text{CH}_3 \xrightarrow[\text{सांद्र HCl}]{\text{Zn - Hg}} ?$

- (a) Describe :
- Aldol condensation
  - Cannizzaro reaction

**QB365-Question Bank Software**


- (b) Describe a chemical test to distinguish between
- Ethanal and Propanal
  - Benzaldehyde and Acetophenone
  - Propan-2-one and Propan-3-one

**OR**


- (a) Draw the structures of the following compounds :

- 4-chloropentan-2-one
- But-2-en-1-al

- (b) Write the product(s) in the following :




30. (a) निम्न रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए :




- (b) निम्न स्थितियों को आप कैसे उचित ठहराएँगे :

- (i) इन यौगिकों में अम्लीय सामर्थ्य निम्न क्रम में बढ़ता है :



- (ii) क्लोरीन के ऑक्सोअम्लों की ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम निम्न है :



- (iii) वाष्प अवस्था में सल्फर अनुचुम्बकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है ।

2, 3

**अथवा**

- (a) वी.एस.ई.पी.आर. (VSEPR) सिद्धान्त का उपयोग करते हुए निम्न की सम्भावित संरचनाओं की प्रागुक्ति कीजिए :







- (b) पदार्थों के निम्न समूहों का प्रत्येक समूह के आगे दिए गए गुणधर्म के क्रम में व्यवस्थित कीजिए :
- $\text{NH}_3, \text{PH}_3, \text{AsH}_3, \text{SbH}_3$  – बढ़ते हुए क्वथनांक मानों के क्रम में
  - O, S, Se, Te – ऋणात्मक चिह्न के साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी के बढ़ते क्रम में
  - $\text{F}_2, \text{Cl}_2, \text{Br}_2, \text{I}_2$  – आबन्ध वियोजन एन्थैल्पी के बढ़ते क्रम में
- (a) Complete the following chemical equations :
- $\text{P}_4 + \text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
  - $\text{XeF}_4 + \text{O}_2\text{F}_2 \rightarrow$
- (b) How would you account for the following situations ?
- The acidic strength of these compounds increases in the following order :  
$$\text{PH}_3 < \text{H}_2\text{S} < \text{HCl}$$
  - The oxidising power of oxoacids of chlorine follows the order :  
$$\text{HClO}_4 < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_2 < \text{HClO}$$
  - In vapour state sulphur exhibits paramagnetic behaviour.
- OR**
- (a) Using VSEPR theory predict the probable structures of the following :
- $\text{N}_2\text{O}_3$
  - $\text{BrF}_3$
- (b) Arrange the following groups of substances in the order of the property indicated against each group :
- $\text{NH}_3, \text{PH}_3, \text{AsH}_3, \text{SbH}_3$  – increasing order of boiling points.
  - O, S, Se, Te – increasing order of electron gain enthalpy with negative sign.
  - $\text{F}_2, \text{Cl}_2, \text{Br}_2, \text{I}_2$  – increasing order of bond dissociation enthalpy.

**CHEMISTRY MARKING SCHEME**



**DELHI -2014**

**SET -56/1/2**

Qn	Answers	Marks
1	Schottky defect	1
2	Emulsions are liquid dispersed in liquid medium	1
3		1
4	The aluminate in solution is neutralized by CO <sub>2</sub> gas and hydrated Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> is precipitated	1
5	H <sub>3</sub> C-CH(Br)-CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	1
6	Due to incomplete filling of d-orbitls	1
7	CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub>	1
8	2-methylpropanal	1
9	Molality - It is defined as the number of moles of the solute per kg of the solvent.	1
	<i>Molarity:</i> Molarity ( <i>M</i> ) is defined as number of moles of solute dissolved in one litre (or one cubic decimetre) of solution	1
	By converting weight of solvent into volume of solution using density	
10	a) IIIrd Order	1
	b) s <sup>-1</sup> / min <sup>-1</sup> / time <sup>-1</sup>	1
11	i) In froth floatation, sulphide ore is wetted by oil and gangue particles by water	1
	ii) Vapour phase refining – in this metal is converted into its volatile compound which is then decomposed to give pure metal	1

12	<p>i) </p> <p>ii) </p>	1
13	<p>i) Due to strong metallic bonding / due to involvement of greater number of electrons from (n-1)d and ns electrons in the interatomic metallic bonding</p> <p>ii) Due to stability of d<sup>0</sup>, d<sup>3</sup> and d<sup>5</sup> orbitals</p>	1
OR		
13	<p>i) The successive decrease in the size of atoms due to filling of inner orbitals in elements of atomic numbers 57 to 71 (in lanthanoid series) is called lanthanoid contraction</p> <p>ii) It causes the radii (atomic sizes) of the third transition series to be very similar to those of the corresponding members of the second series.</p>	1
14	<p>i) Because of the presence of unpaired electrons in d-orbital</p> <p>ii) Because energy released in the formation of bond between Co(III) and ligand is more than the energy required for the conversion of Co(II) to Co(III).</p>	1
15	<p>Glucose does not form the hydrogensulphite addition product with NaHSO<sub>3</sub>.</p> <p>The pentaacetate of glucose does not react with hydroxylamine indicating the absence of free —CHO group.</p>	1
16	<p>i) <math>R-X + R'-\ddot{O}Na \longrightarrow R-\ddot{O}-R' + Na X</math></p> <p>ii) </p>	1
17	<p>i) Because deficiency of vitamin A causes night blindness whereas deficiency of vitamin C causes scurvy.</p> <p>ii) Nucleotide – base + sugar + phosphate whereas nucleoside is combination of base and sugar.</p>	½ +½
18	<p>i) <math>CH_3-CH=CH_2 \xrightarrow{H_2O/H^+} CH_3-CH(OH)-CH_3</math></p>	1



	ii) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-Cl} \xrightarrow{\text{aq. NaOH}} \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{OH} \xrightarrow[\text{CrO}_3/\text{PCC}]{[\text{O}]} \text{CH}_3\text{-CHO}$ (or any other suitable method)	1
19	i) $k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[R]_0}{[R]}$  $\text{Log} \frac{100}{85} = -(1.06 \times 10^{-3}) \text{ min}^{-1} \frac{t}{2.303}$  $t = \frac{0.1635}{1.06 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}} = 153 \text{ min}$	1/2  1/2  1/2
	ii) $\text{Log} \frac{100}{15} = -(1.06 \times 10^{-3}) \text{ min}^{-1} \frac{t}{2.303}$  $t = \frac{0.824 \times 2.303}{1.06 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}}$  $t = 1790 \text{ min}$	1  1/2
20	$m \text{ HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH} = \frac{\Delta T_f}{K_f} = \frac{15.0^\circ\text{C}}{1.86^\circ\text{C/m}} = 8.06\text{m}$  $\Delta T_b = K_b \cdot m \text{ HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH} = (0.52^\circ\text{C/m})(8.06\text{m}) = 4.19^\circ\text{C}$  $T_b = 100.00^\circ\text{C} + 4.19^\circ\text{C}$  $= 104.19^\circ\text{C}$	1  1  1
21	$\text{Mass per unit cell} = \frac{63.55 \text{ g mol}^{-1}}{6.023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}} \times 4 = 4.22 \times 10^{-22} \text{ g}$  $\text{Volume of unit cell} = \frac{\text{mass}}{\text{density}} = 4.22 \times 10^{-22} \text{ g} / 8.95 \text{ g cm}^{-3} = 4.71 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$  $\text{Edge} = (\text{volume})^{1/3} = (4.71 \times 10^{-23} \text{ cm}^3)^{1/3}$ $= 3.61 \times 10^{-8} \text{ cm} = 361 \text{ pm}$  $r = \frac{a}{2\sqrt{2}}$  $= \frac{361 \text{ pm}}{2 \times 1.41} = 128 \text{ pm}$	1/2  1/2  1  1/2  1/2
22	i) Sorption- the process in which adsorption and absorption are taking place simultaneously ii) Tyndall effect- scattering of light by the colloidal particles due to which the path of light becomes visible iii) Electrophoresis- the process of movement of colloidal particles towards the oppositely charged electrodes when current is passed through it.	1  1  1
23	i) Because of salt formation by -NH <sub>2</sub> group with anhyd. AlCl <sub>3</sub> ii) Because of hydrogen bonding of ethylamine with H <sub>2</sub> O whereas aniline does not form hydrogen bond with H <sub>2</sub> O.	1  1

	iii) Because of electron donating CH <sub>3</sub> group, electron density on 'N' increases whereas in aniline electron density on 'N' decreases due to resonance.	1
24	a) i) CH <sub>3</sub> I                      ii) CH <sub>3</sub> Cl  b) i) CH <sub>3</sub> CN  ii)  + 	½+ ½  1       ½ +½
25	i) Pentaamminechloridocobalt (III) chloride  ii) Potassium hexacyanidoferrate (III)  iii) Tetrachloridonickelate (II)	1  1  1
	OR	



25		1  1  1
26	<p>a) Sweetening agents : the substances which when added to any matter gives sweet taste. For example : Sugar (or any other suitable example)</p> <p>b) Food preservatives : Food preservatives prevent spoilage of food due to microbial growth. For example : Table salt (or any other suitable example)</p> <p>c) Antibiotics which in low concentration inhibit the growth or destroy the micro organism For example : Chloramphenicol (or any other suitable example)</p>	1 1 1
27	<p>i) Chloroprene / 2-chloro-1,3-butadiene</p> <p>ii) Styrene</p> <p>iii) Propene</p>	1 1 1



	<p>does not.</p> <p>ii) Acetophenone- On heating with NaOH +I<sub>2</sub>, forms yellow ppt of iodoform whereas Benzaldehyde does not (or any other test)</p> <p>iii)As there is a misprint in the question, award 1 mark for any attempt.</p>	<p>1</p> <p>1</p>
	OR	
29	<p>a) i) CH<sub>3</sub>COCH<sub>2</sub>CH(Cl)CH<sub>3</sub></p> <p>ii)CH<sub>3</sub>CH=CH-CHO</p> <p>b) i) CH<sub>2</sub>(Br)COOH</p> <p>ii) CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OH</p> <p>iii)CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub></p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
30	<p>a) i) <math>P_4 + 3NaOH + 3H_2O \rightarrow PH_3 + 3NaH_2PO_2</math></p> <p>ii) <math>XeF_4 + O_2F_2 \rightarrow XeF_6 + O_2</math></p> <p>b) i) Because of increase in electronegativity from Phosphorous to Chlorine</p> <p>ii) Because of decrease in oxidation state of Chlorine from HClO<sub>4</sub> to HClO.</p> <p>iii) Because in vapour form, sulphur exists as S<sub>2</sub> molecules and contains unpaired electrons.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
	OR	
30	<p>a) i) </p> <p>ii) </p>	<p>1</p> <p>1</p>

## QB365-Question Bank Software

b) i) $\text{SbH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{PH}_3 < \text{NH}_3$	1
ii) $\text{Te} < \text{Se} < \text{O} < \text{S}$	1
iii) $\text{I}_2 < \text{Br}_2 < \text{F}_2 < \text{Cl}_2$	1

Sr. No.	Name	Sr. No.	Name
1	Dr. (Mrs.) Sangeeta Bhatia	4	Sh. S.K. Munjal
2	Dr. K.N. Uppadhya	5	Sh. Rakesh Dhawan
3	Sh. D.A. Mishra	6	Ms. Garima Bhutani

