

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **12** हैं ।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें ।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **30** प्रश्न हैं ।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें ।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।
- Please check that this question paper contains **12** printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **30** questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक)

CHEMISTRY (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 70

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 70

QB365-Question Bank Software

सामान्य निर्देश :

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (ii) प्रश्न-संख्या 1 से 8 तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है ।
- (iii) प्रश्न-संख्या 9 से 18 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं ।
- (iv) प्रश्न-संख्या 19 से 27 तक भी लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक हैं ।
- (v) प्रश्न-संख्या 28 से 30 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक हैं ।
- (vi) आवश्यकतानुसार लॉग टेबलों का प्रयोग करें । कैल्कुलेटर्स के उपयोग की अनुमति नहीं है ।

General Instructions :

- (i) *All questions are compulsory.*
- (ii) *Questions number 1 to 8 are very short-answer questions and carry 1 mark each.*
- (iii) *Questions number 9 to 18 are short-answer questions and carry 2 marks each.*
- (iv) *Questions number 19 to 27 are also short-answer questions and carry 3 marks each.*
- (v) *Questions number 28 to 30 are long-answer questions and carry 5 marks each.*
- (vi) *Use Log Tables, if necessary. Use of calculators is **not** allowed.*

1. 'प्रतिलोहचुम्बकत्व' का क्या तात्पर्य है ? 1
What is meant by 'antiferromagnetism' ?
2. अपोहन (डायलिसिस) को परिभाषित कीजिए । 1
Define dialysis.

3. इसके अयस्क से ऐलुमिनियम निष्कर्षण धातुकर्म में CO₂ की क्या भूमिका होती है ? 1

What is the role of CO₂ in the extractive metallurgy of aluminium from its ore ?


4. नाइट्रोजन गैस बहुत निष्क्रिय क्यों है ? 1

Why is nitrogen gas very unreactive ?


5. प्रोपेन-2-ओन और पेंटेन-3-ओन के बीच अंतर करने के लिए एक जाँच लिखिए । 1

Give a test to distinguish between propan-2-one and pentan-3-one.

6. उस ऐल्कोहॉल का नाम लिखिए जिसका निम्न एस्टर को बनाने में उपयोग किया जाता है : 1



Name the alcohol that is used to make the following ester :



7. 'पेप्टाइड लिंकेज' को परिभाषित कीजिए । 1

Define a 'Peptide linkage'.

8. 'होमोपॉलीमर', 'कोपॉलीमर' से कैसे भिन्न होता है ? 1

How does a homopolymer differ from a copolymer ?

9. एक विद्युत्-अपघट्य के विलयन के लिए चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए । तापमान में परिवर्तन के साथ उनके विचरण की चर्चा कीजिए । 2

Define conductivity and molar conductivity for the solution of an electrolyte. Discuss their variation with change in temperature.

10. निम्नलिखित प्रत्येक को परिभाषित कीजिए : 2

- (i) विशिष्ट अभिक्रिया दर
- (ii) अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा

Define each of the following :

- (i) Specific rate of a reaction
- (ii) Energy of activation of a reaction

11. निम्न प्रक्रमों में प्रत्येक के आधारमूल सिद्धान्त का वर्णन कीजिए : 2

- (i) NaCN विलयन के साथ सिल्वर अयस्क को निक्षालित करने से प्राप्त हुए विलयन से सिल्वर की पुनःप्राप्ति
- (ii) एक अशुद्ध धातु का विद्युत्-अपघटनी परिष्करण

अथवा

निम्न प्रक्रमों में प्रत्येक के पीछे जो कार्यकारी सिद्धान्त है उसका वर्णन कीजिए : 2

- (i) धातु का ज़ोन (मंडल) परिष्करण
- (ii) धातुओं की वाष्प प्रावस्था का परिष्करण

Describe the underlying principle of each of the following processes :



- (i) Recovery of silver from the solution obtained by leaching silver ore with a solution of NaCN
- (ii) Electrolytic refining of a crude metal

OR



Describe the principle involved in each of the following processes :

- (i) Zone refining of a metal
- (ii) Vapour phase refining of metals

12. निम्न रासायनिक अभिक्रिया समीकरणों को पूर्ण करके लिखिए : 2



Complete the following chemical reaction equations :



13. निम्नलिखित के कारण लिखिए : 2

- (i) कॉपर(I) आयन का जलीय विलयनों में होना नहीं जाना जाता है ।
- (ii) O_2 और F_2 दोनों ही संक्रमण धातुओं की उच्च उपचयन अवस्थाओं को स्थिरता देती हैं परन्तु उच्च उपचयन अवस्था को स्थिरता देने में ऑक्सीजन की क्षमता फ्लूओरीन से अधिक होती है ।

Assign reasons for the following :

- (i) Copper(I) ion is not known to exist in aqueous solutions.
- (ii) Both O_2 and F_2 stabilize high oxidation states of transition metals but the ability of oxygen to do so exceeds that of fluorine.


14. निम्न आर्गेनिक हैलोजन यौगिकों की संरचनाएँ लिखिए : 2

- (i) 4-टर्ट-ब्यूटिल-3-आयडोहेप्टेन
- (ii) 4-ब्रोमो-3-मेथिलपेंट-2-ईन


Write the structures of the following organic halogen compounds :

- (i) 4-tert-Butyl-3-iodoheptane
- (ii) 4-Bromo-3-methylpent-2-ene


15. (i) निम्न यौगिकों को क्षारक सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए :




(ii) निम्न यौगिकों को pK_b मानों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए :



(i) Arrange the following compounds in an increasing order of basic strength :



(ii) Arrange the following compounds in a decreasing order of pK_b values :



16. उभयकारणी नाभिकस्नेही (ऐम्बिडेण्ट न्यूक्लिओफाइल्स) क्या होते हैं ? एक उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए । 2

What are ambident nucleophiles ? Explain with an example.

17. निम्न बहुलकों को प्राप्त करने के लिए जो एकलक उपयोग में लाए जाते हैं उनके नाम और उनकी संरचनाएँ लिखिए :

2

- (i) बूना-S
- (ii) नाइलॉन-6, 6

Write the names and structures of monomers used for getting the following polymers :

- (i) Buna-S
- (ii) Nylon-6, 6

18. यौगिकों के निम्न युग्मों के बीच अंतर करने के लिए एक-एक रासायनिक जाँच दीजिए :

2

- (i) एथिलऐमीन और ऐनिलीन
- (ii) ऐनिलीन और बेन्ज़िलऐमीन

Give a chemical test to distinguish between each of the following pairs of compounds :

- (i) Ethylamine and Aniline
- (ii) Aniline and Benzylamine

19. दो भिन्न-भिन्न तापमानों पर विघटन अभिक्रिया के लिए k के मान नीचे दिए गए हैं :

$$k_1 = 2.15 \times 10^{-8} \text{ L/(mol.s), } 650 \text{ K पर}$$

$$k_2 = 2.39 \times 10^{-7} \text{ L/(mol.s), } 700 \text{ K पर}$$

अभिक्रिया के लिए E_a का मान परिकलित कीजिए ।

$$(\text{Log } 11.11 = 1.046) \quad (R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})$$

3

For a decomposition reaction, the values of k at two different temperatures are given below :

$$k_1 = 2.15 \times 10^{-8} \text{ L/(mol.s) at } 650 \text{ K}$$

$$k_2 = 2.39 \times 10^{-7} \text{ L/(mol.s) at } 700 \text{ K}$$

Calculate the value of E_a for the reaction.

$$(\text{Log } 11.11 = 1.046) \quad (R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})$$

20. 286.65 pm किनारे (सेल) के विस्तार के साथ आयरन का काय केन्द्रित घनीय यूनिट सेल है। आयरन का घनत्व 7.874 g cm^{-3} है। इस सूचना का उपयोग करते हुए एवोगैट्रो संख्या का परिकलन कीजिए। (Fe का ग्राम परमाण्विक द्रव्यमान = 55.84 g mol^{-1}) 3

Iron has a body centred cubic unit cell with a cell dimension of 286.65 pm. The density of iron is 7.874 g cm^{-3} . Use this information to calculate Avogadro's number (Gram atomic mass of Fe = 55.84 g mol^{-1}).

21. 25° C पर 0.01 M NaCl विलयन का प्रतिरोध 200Ω है। प्रयुक्त चालकता-सेल का सेल स्थिरांक एक है। विलयन की मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 3

The resistance of 0.01 M NaCl solution at 25° C is 200Ω . The cell constant of the conductivity cell used is unity. Calculate the molar conductivity of the solution.

22. उपयुक्त उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए कि अधिशोषण के दो प्रकार के प्रक्रम (भौतिक व रासायनिक अधिशोषण) किस प्रकार तापमान, अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल और सक्रियण ऊर्जा के मान से प्रभावित होते हैं? 3

अथवा

स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए कि अधिशोषण की परिघटना निम्न में कैसे अनुप्रयोग पाती है : 3

(i) एक बर्तन में निर्वात पैदा करने में

(ii) विषमांगी उत्प्रेरण में

(iii) धातुकर्म में फेन प्लवन प्रक्रम में

Giving appropriate examples, explain how the two types of processes of adsorption (physisorption and chemisorption) are influenced by the prevailing temperature, the surface area of adsorbent and the activation energy of the process ?

OR

Explain clearly how the phenomenon of adsorption finds application in

(i) production of vacuum in a vessel

(ii) heterogeneous catalysis

(iii) froth floatation process in metallurgy

23. निम्नलिखित के कारण बतलाइए : 3

- (i) Cu(I) आयन का जलीय विलयनों में होना नहीं जाना जाता है ।
- (ii) क्षार (ऐल्कैली) धातुओं की अपेक्षा संक्रमण धातुएँ अधिक कठोर होती हैं ।
- (iii) तत्त्व प्रति तत्त्व ऐक्टिनोयड संकुचन, लैन्थैनोयड संकुचन से अपेक्षाकृत अधिक होता है ।

Assign reasons for the following :

- (i) Cu(I) ion is not known to exist in aqueous solutions.
- (ii) Transition metals are much harder than the alkali metals.
- (iii) From element to element actinoid contraction is greater than the lanthanoid contraction.

24. निम्नलिखित प्रत्येक अवस्था में एक उदाहरण के साथ उपसहसंयोजन यौगिकों की भूमिका की संक्षेप में चर्चा कीजिए : 3

- (i) धातुओं के निष्कर्षण धातुकर्म में
- (ii) विश्लेषणात्मक रसायन में

Giving one example in each of the following cases, discuss briefly the role of coordination compounds in

- (i) extraction metallurgy of metals
- (ii) analytical chemistry

25. आवश्यक और अनावश्यक ऐमीनो अम्ल क्या होते हैं ? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए । 3

What are essential and non-essential amino acids ? Give two examples of each.

26. प्रत्येक के लिए एक-एक उदाहरण के साथ निम्न की व्याख्या कीजिए :

- (i) कोल्बे की अभिक्रिया
- (ii) रीमर-टीमान अभिक्रिया
- (iii) विलियमसन ईथर संश्लेषण

Explain the following with an example for each :

- (i) Kolbe's reaction
- (ii) Reimer-Tiemann reaction
- (iii) Williamson ether synthesis

27. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

3

- (i) डॉक्टर के परामर्श के बिना औषधियों को क्यों नहीं लेना चाहिए ?
- (ii) 'ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऐन्टिबायोटिक्स' का क्या तात्पर्य होता है ?
- (iii) डिटाल (Dettol) के मुख्य घटक क्या हैं ?

Answer the following questions :

- (i) Why should medicines not be taken without consulting a doctor ?
- (ii) What is meant by 'broad spectrum antibiotics' ?
- (iii) What are the main constituents of Dettol ?

28. (a) निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए :

- (i) $\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$
- (ii) $\text{Ph} - \text{CH} = \text{CH} - \text{CHO}$

(b) निम्न रूपांतरणों का वर्णन आप दो चरणों से अधिक नहीं में कैसे करेंगे :

- (i) एथैनाल को 3-हाइड्रॉक्सीब्यूटेनैल में
- (ii) बेन्ज़ोइक अम्ल को m-नाइट्रोबेन्ज़िल ऐल्कोहॉल में
- (iii) प्रोपेनोन को प्रोपीन में

2, 3

अथवा

(a) निम्न यौगिकों की संरचनाएँ आरेखित कीजिए :

- (i) 4-क्लोरोपेंटेन-2-ओन
- (ii) p-नाइट्रोप्रोपिओफीनोन

(b) यौगिकों के निम्न युग्मों में भिन्नता करने के लिए जाँचों को दीजिए :

- (i) एथैनाल और प्रोपेनाल में
- (ii) फीनाल और बेन्ज़ोइक अम्ल में
- (iii) बेन्ज़ैल्डिहाइड और ऐसीटोफीनोन में

2, 3

QB365-Question Bank Software

- (a) Write the IUPAC names of the following compounds :
- $\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$
 - $\text{Ph} - \text{CH} = \text{CH} - \text{CHO}$
- (b) Describe the following conversions in not more than two steps :
- Ethanol to 3-Hydroxybutanal
 - Benzoic acid to m-Nitrobenzyl alcohol
 - Propanone to Propene

OR

- (a) Draw the structures of the following compounds :
- 4-Chloropentan-2-one
 - p-Nitropropiofenone
- (b) Give tests to distinguish between the following pairs of compounds :
- Ethanal and Propanal
 - Phenol and Benzoic acid
 - Benzaldehyde and Acetophenone

29. (a) वैण्ट हॉफ कारक क्या होता है ? इसके मान किस प्रकार के होते हैं यदि विलयन के बनने में विलेय के अणु
- विघटित होते हैं ?
 - संगठित होते हैं ?
- (b) Na_2CO_3 और NaHCO_3 के 1 g मिश्रण में दोनों पदार्थों की समान मोलर मात्राएँ मिली हुई हैं । इस मिश्रण के साथ पूर्ण रूप से अभिक्रिया करने के लिए 0.1 M HCl विलयन के कितने mL की आवश्यकता होगी ?

2, 3

(मोलर द्रव्यमान : $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 106 \text{ g}$, $\text{NaHCO}_3 = 84 \text{ g}$)

अथवा

- (a) परिभाषा लिखिए :
- मोल प्रभांश
 - मोललता
 - राउल्ट का नियम

- (b) पूर्ण रूप से वियोजित मानते हुए, उस विलयन का प्रत्याशित हिमांक परिकल्पित कीजिए जो 0.100 kg जल में ग्लॉबर लवण (सज्जी), $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$ के 6.00 g को घुलाने से बनाया गया हो।
(जल के लिए $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$, परमाणु द्रव्यमान : Na = 23, S = 32, O = 16, H = 1)

3, 2

- (a) What is van't Hoff factor ? What types of values can it have if in forming the solution the solute molecules undergo
(i) Dissociation ?
(ii) Association ?
- (b) How many mL of a 0.1 M HCl solution are required to react completely with 1 g of a mixture of Na_2CO_3 and NaHCO_3 containing equimolar amounts of both ?
(Molar mass : $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 106 \text{ g}$, $\text{NaHCO}_3 = 84 \text{ g}$)

OR

- (a) Define
(i) Mole fraction
(ii) Molality
(iii) Raoult's law
- (b) Assuming complete dissociation, calculate the expected freezing point of a solution prepared by dissolving 6.00 g of Glauber's salt, $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$ in 0.100 kg of water.
(K_f for water = $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$, Atomic masses : Na = 23, S = 32, O = 16, H = 1)

30. (a) उस उत्कृष्ट गैस स्पीशीज का सूत्र लिखिए और उसकी संरचना का वर्णन कीजिए जो निम्न के साथ समसंरचनात्मक हो :
(i) IBr_2^-
(ii) BrO_3^-
- (b) निम्न के कारण लिखिए :
(i) SF_6 गतिकतः निष्क्रिय होता है।
(ii) NF_3 एक ऊष्माक्षेपी यौगिक है जबकि NCl_3 ऐसा नहीं है।
(iii) HF की अपेक्षा HCl प्रबलतर अम्ल है यद्यपि फ्लुओरीन क्लोरीन की अपेक्षा अधिक विद्युत्-ऋणात्मक है।

2, 3

अथवा

- (a) बड़े पैमाने पर अमोनिया कैसे बनाई जाता है ? उस प्रक्रम का नाम दीजिए और इस प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए ।
- (b) निम्न के लिए कारण लिखिए :
- H_2O की अपेक्षा H_2S अधिक अम्लीय है ।
 - PH_3 की अपेक्षा NH_3 अधिक क्षारीय है ।
 - ऑक्सीजन की अपेक्षा सल्फर में शृंखलन की प्रवृत्ति अधिक है ।

2, 3

- (a) Write the formula and describe the structure of a noble gas species which is isostructural with
- IBr_2^-
 - BrO_3^-
- (b) Assign reasons for the following :
- SF_6 is kinetically inert.
 - NF_3 is an exothermic compound whereas NCl_3 is not.
 - HCl is a stronger acid than HF though fluorine is more electronegative than chlorine.


OR

- (a) How is ammonia prepared on a large scale ? Name the process and mention the optimum conditions for the production of ammonia by this process.
- (b) Assign reasons for the following :
- H_2S is more acidic than H_2O .
 - NH_3 is more basic than PH_3 .
 - Sulphur has a greater tendency for catenation than oxygen.

CHEMISTRY MARKING SCHEME
OUTSIDE DELHI -2014
SET -56/2

Qn	Answers	Marks
1	Domains are oppositely oriented and cancel out each other's magnetic moment.	1
2	It is a process of removing dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane.	1
3	The aluminate in solution is neutralized by CO ₂ gas and hydrated Al ₂ O ₃ is precipitated	1
4	Because of N≡N triple bond / high bond dissociation enthalpy.	1
5	On heating with NaOH +I ₂ , propan – 2-one forms yellow ppt of iodoform whereas pentan-3-one does not.	1
6	2-propanol / propan-2-ol	1
7	The linkage between two amino acids i.e. – CO-NH – is known as peptide linkage.	1
8	Homopolymer is formed by repeating the same monomer unit whereas copolymer is formed by repeating two different monomers.	1
9	Conductivity of solution is inverse of resistivity $k = G l/A$ Limiting molar conductivity – when concentration approaches zero the conductivity is known as limiting molar conductivity	1 1
10	a) Rate of change in concentration of reactants / products per unit time under specified conditions. b) The energy required to form an intermediate, called as activated complex, is known as energy of activation.	1 1
11	a) Ag with dil NaCN forms a complex i.e. [Ag(CN) ₂] ⁻ which dissolves and is subsequently reduced by Zn to give silver b) Electrolytic refining – in this method impure metal is made to act as an anode and the pure metal as cathode in a suitable electrolytic bath containing soluble salt of the same metal. Pure metal is deposited at cathode.	1 1
	OR	


QB365-Question Bank Software

11	<p>a) It is based on the principle that the impurities are more soluble in the melt than in the solid state of the metal.</p> <p>b) In this, the metal is converted into its volatile compound which is then decomposed to give pure metal.</p>	1
12	<p>a) $2\text{KClO}_3 \xrightarrow[\text{MnO}_2]{\Delta} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$</p> <p>b) $6\text{XeF}_4 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Xe} + 2\text{XeO}_3 + 24\text{HF} + 3\text{O}_2$ (Note: balancing is not necessary)</p>	1 1
13	<p>a) Because it undergoes disproportionation reaction / $2\text{Cu}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu}(\text{s}) + \text{Cu}^{2+}(\text{aq})$</p> <p>b) Because of the ability of oxygen to form multiple bonds</p>	1 1
14	<p>i) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{I})\text{CH}(\text{C}(\text{CH}_3)_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$</p> <p>ii) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}(\text{Br})\text{CH}_3$</p>	1 1
15	<p>a) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{C}_6\text{H}_5\text{N}(\text{CH}_3)_2 < \text{CH}_3\text{NH}_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$</p> <p>b) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 > \text{C}_6\text{H}_5\text{NHCH}_3 > \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 > (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$</p>	1 1
16	<p>An ambident nucleophile is that which possesses two nucleophilic centres</p> <p>For e.g. CN^- (it forms cyanides and isocyanides) (or any other correct example)</p>	1 1
17	<p>a) 1,3 - Butadiene and styrene / $n \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2 +$  Styrene</p> <p>b) Hexamethylenediamine and adipic acid / $n \text{HOOC}(\text{CH}_2)_4\text{COOH} + n \text{H}_2\text{N}(\text{CH}_2)_6\text{NH}_2$</p>	1/2+ 1/2 1/2+ 1/2
18	<p>a) On adding benzene diazonium chloride, aniline forms azo dye whereas ethylamine does not.</p> <p>b) On adding benzene diazonium chloride, aniline forms azo dye whereas benzylamine does not.</p>	1 1

19	$\text{Log} \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303R} \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right]$ $\text{Log} \frac{2.39 \times 10^{-7} \text{L}/(\text{mol}\cdot\text{s})}{2.15 \times 10^{-8} \text{L}/(\text{mol}\cdot\text{s})} = \frac{E_a}{2.303 \times 8.314 \times 10^{-3} \text{ kJ/Kmol}} \left[\frac{1}{650\text{K}} - \frac{1}{700\text{K}} \right]$ $\text{Log } 11.12 = \frac{E_a}{2.303 \times 8.314 \times 10^{-3} \text{ kJ}} \times \frac{700-650}{4.5 \times 10^5}$ $1.046 = \frac{E_a}{2.303 \times 8.314 \times 10^{-3} \text{ kJ}} \times \frac{700-650}{4.5 \times 10^5}$ $E_a = \frac{1.046 \times 2.303 \times 8.314 \times 10^2 \times 4.5}{50} = 180.16 \text{ kJ}$	1 1 1
20	$N_A = \frac{Z \times M}{a^3 \times d}$ $= \frac{2 \times 56 \text{ g mol}^{-1}}{(2.866 \times 10^{-8})^3 \text{ cm}^3 \times 7.874 \text{ g cm}^{-3}}$ $= 6.04 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ <p>Or</p> $286.65 \times 10^{-10} \text{ cm} = 2.866 \times 10^{-8} \text{ cm}$ $\text{Mass of Fe atom} = (2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 \times 7.874 \text{ g cm}^{-3} \times 1/2 = 23.54 \times 10^{-24} \times 3.94 \text{ g} = 92.59 \times 10^{-24} \text{ g}$ $N_A = 56 \text{ g mol}^{-1} / 92.59 \times 10^{-24} \text{ g}$ $= 6.04 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	1 1 1 1½ 1½
21	$R = 200 \Omega$ $\text{Cell constant} = \frac{1}{a} = 1 \text{ cm}^{-1}$ $\text{Conductivity, } k = \frac{1}{R} \times \frac{1}{a} = \frac{1}{200 \Omega} \times \text{cm}^{-1}$ $= 5.0 \times 10^{-3} \Omega^{-1} \text{ cm}^{-1}$ $\wedge = \frac{K(\text{Scm}^{-1}) \times (1000 \text{ cm}^3 \text{L}^{-1})}{C(\text{mol}^{-1})}$ $= \frac{(5.0 \times 10^{-3} \text{ Scm}^{-1}) (1000 \text{ cm}^3 \text{L}^{-1})}{0.01 \text{ mol L}^{-1}}$ $= 500 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$	1 1 1

QB365-Question Bank Software

22	Effect of temperature- physisorption decreases with increase of temperature and chemisorption first increases then decreases with increase of temperature Surface area – greater the surface area greater is the physisorption and chemisorption In physisorption, no appreciable activation energy is needed. In chemisorption, sometimes high activation energy is needed.	1 1 1
OR		
22	(i) Production of high vacuum: The remaining traces of air can be adsorbed by charcoal from a vessel evacuated by a vacuum pump to give a very high vacuum. (ii) Heterogeneous catalysis: Adsorption of reactants on the solid surface of the catalysts increases the rate of reaction. (iii) Froth floatation process: A low grade sulphide ore is concentrated by separating it from silica and other earthy matter by this method using pine oil and frothing agent	1 1 1
23	a) Because it undergoes disproportionation reaction / $2\text{Cu}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu}(\text{s}) + \text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ b) Because of the involvement of greater number of electrons from (n-1) d in addition to ns electrons in the interatomic metallic bonding c) The 5f electrons provide poor shielding from elements to elements in the actinoid series.	1 1 1
24	i) Some important extraction processes of metals, like those of silver and gold, make use of complex formation. Gold, for example, combines with cyanide in the presence of oxygen and water to form the coordination entity $[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$ in aqueous solution. Gold can be separated in metallic form from this solution by the addition of zinc. ii) The familiar colour reactions given by metal ions with a number of ligands (especially chelating ligands), as a result of formation of coordination entities, form the basis for their detection and estimation by classical and instrumental methods of analysis. Examples of such reagents include EDTA, DMG (dimethylglyoxime)	1½ 1½
25	The amino acids, which can be synthesised in the body, are known as nonessential amino acids. for example : glycine, alanine (or any other) The amino acids which cannot be synthesised in the body and must be obtained through diet, are known as essential amino acids for example : valine, leucine (or any other)	1+½ 1+½

		OR	
28	a) i) $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_2\text{-CH(Cl)-CH}_3$		1
	ii)		
			1
	b) i) On heating with $\text{NaOH} + \text{I}_2$, ethanal forms yellow ppt of iodoform whereas propanal does not.		1
	ii) Phenol gives neutral FeCl_3 test / NaHCO_3 test		1
iii) Acetophenone- On heating with $\text{NaOH} + \text{I}_2$, forms yellow ppt of iodoform		1	
	Benzaldehyde- gives tollen's test / Schiff Test		1
29	a)		
		$t = \frac{\text{Normal molar mass}}{\text{Abnormal molar mass}}$ $= \frac{\text{Observed colligative property}}{\text{Calculated colligative property}}$ $t = \frac{\text{Total number of moles of particles after association/dissociation}}{\text{Number of moles of particles before association/dissociation}}$	(any one)
	i)	For dissociation, $i > 1$	$\frac{1}{2}$
	ii)	For association, $i < 1$	$\frac{1}{2}$
	b) Reaction		
		$\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \longrightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$	
		106g	
		$\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$	
		84g	
		A mixture of 1 mol Na_2CO_3 and 1 mol NaHCO_3 reacts with 3 mol of HCl	
	1 mol Na_2CO_3 and 1 mol $\text{NaHCO}_3 = 106+84 = 190$ g		
	190g mixture reacts completely with 3 mol HCl		
	Mol of HCl that will reacts with 1g =		
	$\frac{3 \text{ mol}}{190 \text{ g}} \times 1 \text{ g} = \frac{3}{190} \text{ mol} = 3 \times \frac{3 \times 10^3}{190} \text{ m mol}$		
	We know that		
	Molarity x volume (ml) = no. of m mole		
		$\frac{1}{2}$	

	$0.1 \times V_{\text{HCl}} = \frac{3 \times 10^3}{190}$ $V_{\text{HCl}} = \frac{3 \times 10^3}{190 \times 0.1} = 157.9 \text{ mL}$	<p>1/2</p> <p>1</p>
	OR	
29	<p>a) i) It is defined as the number of moles of the component to the total number of moles of all the components /</p> <p>Mole fraction of a component =</p> $\frac{\text{Number of moles of the component}}{\text{Total number of moles of all the components}}$ <p>ii) It is defined as the number of moles of the solute per kg of the solvent. /</p> $\text{Molality (m)} = \frac{\text{Moles of solute}}{\text{Mass of solvent in kg}}$ <p>iii) According to Raoult's law, the partial pressure of a volatile component or gas is directly proportional to its mole fraction in solution</p> <p>b) Molar mass $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O} = 2 \times 23 + 32 + 16 \times 4 + 20 \times 1 + 16 \times 10 = 322 \text{ g mol}^{-1}$ No. of mol $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ dissolved in 01.10kg of water $= \frac{6.00 \text{ g}}{322 \text{ g mol}^{-1}} = \frac{6}{322} \text{ mol}$ Since there is complete dissociation, van't Hoff factor, $i = 3$ $\Delta T_f = i K_f m = i \times K_f \times n_b / w_A$ $= \frac{3 \times (1.86 \text{ K kg mol}^{-1}) \times \frac{6}{322} \text{ mol}}{0.10 \text{ kg}} = 1.04 \text{ K}$ Freezing point $273.15 \text{ K} - 1.04 \text{ K} = 272.1 \text{ K}$</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1/2</p> <p>1</p> <p>1/2</p>
30	<p>a) i) XeF_2 - linear</p> <p>ii) XeO_3 - pyramidal</p> <p>b) i) Because sulphur is sterically protected by six F atoms</p> <p>ii) Bond dissociation enthalpy of F_2 is lower than that of Cl_2 involved in the process.</p> <p>iii) Bond dissociation enthalpy of HCl is lower than that of HF</p>	<p>1/2+1/2</p> <p>1/2+1/2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
	OR	

30	a) $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \xrightleftharpoons{\text{Fe}} 2\text{NH}_3$ Haber's process	1/2
	Catalyst –iron oxide + K_2O + Al_2O_3	1/2
	Conditions: low temperature / 700 K and high pressure	1/2+ 1/2
	b) i) Bond dissociation enthalpy of S-H bond is lower than that of O-H bond.	1
	ii) Due to small size of N than P, lone pair is readily available for donation in NH_3 whereas in PH_3 lone pair is delocalized due to larger size of P	1
	iii) Because S-S single bond is stronger than O-O single bond.	1

Sr. No.	Name	Sr. No.	Name
1	Dr. (Mrs.) Sangeeta Bhatia	4	Sh. S.K. Munjal
2	Dr. K.N. Uppadhyaya	5	Sh. Rakesh Dhawan
3	Sh. D.A. Mishra	6	Ms. Garima Bhutani