SET-1

Series SSO/2

कोड नं. Code No. 56/2/1/F

रोल नं.				
Roll No.				

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 15 हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 26 प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पृस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains 15 printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **26** questions.
- Please write down the Serial Number of the question before attempting it.
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक) CHEMISTRY (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे अधिकतम अंक : 70

Time allowed: 3 hours Maximum Marks: 70

सामान्य निर्देश:

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रश्न संख्या 1 से 5 तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है।
- (iii) प्रश्न संख्या 6 से 10 तक लघ्-उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं।
- (iv) प्रश्न संख्या 11 से 22 तक भी लघ्-उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक हैं।
- (v) प्रश्न संख्या 23 मृल्याधारित प्रश्न है और इसके लिए 4 अंक हैं।
- (vi) प्रश्न संख्या **24** से **26** तक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए **5** अंक हैं।
- (vii) यदि आवश्यकता हो, तो लॉग टेबलों का प्रयोग करें। कैल्कुलेटरों के उपयोग की अनुमित नहीं है।

General Instructions:

- (i) **All** questions are compulsory.
- (ii) Questions number 1 to 5 are very short answer questions and carry 1 mark each.
- (iii) Questions number 6 to 10 are short answer questions and carry 2 marks each.
- (iv) Questions number 11 to 22 are also short answer questions and carry 3 marks each.
- (v) Question number 23 is a value based question and carry 4 marks.
- (vi) Questions number **24** to **26** are long answer questions and carry **5** marks each.
- (vii) Use log tables, if necessary. Use of calculators is **not** allowed.
- 1. निम्नलिखित युग्म में कौन ${
 m S_N}2$ अभिक्रिया अधिक तीव्रता से करेगा और क्यों ? ${
 m CH_3-CH_2-Br} \quad {
 m और} \quad {
 m CH_3-CH_2-I}$

Which would undergo S_N^2 reaction faster in the following pair and why?

1

$$CH_3 - CH_2 - Br$$
 and $CH_3 - CH_2 - I$

1

1

दिए गए यौगिक का आई.यू.पी.ए.सी. नाम लिखिए: 3.

$$\begin{array}{c} \operatorname{HO}-\operatorname{CH}_2-\operatorname{CH}=\operatorname{C}-\operatorname{CH}_3 \\ | \\ \operatorname{CH}_3 \end{array}$$

Write the IUPAC name of the given compound:

$$\begin{aligned} \text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH} &= \text{C}-\text{CH}_3\\ | &\text{CH}_3 \end{aligned}$$

उस यौगिक का सूत्र क्या है जिसमें तत्त्व Y ccp जालक बनाता है और X के परमाण् 4. अष्टफलकीय रिक्ति का 2/3वाँ भाग घेरते हैं ?

What is the formula of a compound in which the element Y forms ccp lattice and atoms of X occupy 2/3rd of octahedral voids?

- भौतिकशोषण उत्क्रम<mark>णीय</mark> है जबिक <mark>रासायनिकशो</mark>षण अनृत्क्रमणीय होता है । क्यों ? 5. 1 Physisorption is reversible while chemisorption is irreversible. Why?
- निम्नलिखित कॉम्प्लेक्स का आई.यू.पी.ए.सी. नाम लिखिए : 6. (i) $[Cr (en)_3]Cl_3$
 - निम्नलिखित कॉम्प्लेक्स का सूत्र लिखिए : (ii) पोटैशियम टाई ऑक्सलैटो क्रोमेट(III)

(i) Write down the IUPAC name of the following complex: $[Cr (en)_3]Cl_3$

(ii) Write the formula for the following complex: Potassium tri oxalato chromate(III)

QB365-Question Bank Software राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन से क्या तात्पर्य है ? एक उदाहरण दीजिए । ऋणात्मक 7. विचलन के लिए $\Delta_{mix}H$ का क्या चिह्न होता है ?

2

एजिओटोप को परिभाषित कीजिए । राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन द्वारा बनने वाला एज़िओटोप किस प्रकार का होता है ? एक उदाहरण दीजिए ।

2

What is meant by negative deviation from Raoult's law? Give an example. What is the sign of $\Delta_{mix}H$ for negative deviation?

OR.

Define azeotropes. What type of azeotrope is formed by negative deviation from Raoult's law? Give an example.

निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयोग आने वाले अभिकारकों के नाम दीजिए : 8.

2

(i)
$$CH_3 - CHO \xrightarrow{?} CH_3 - CH - CH_3$$

(ii)
$$CH_3 - COOH \xrightarrow{?} CH_3 - COCI$$

Name the reagents used in the following reactions:

(i)
$$CH_3 - CHO \xrightarrow{?} CH_3 - CH - CH_3$$

OH

(ii)
$$CH_3 - COOH \xrightarrow{?} CH_3 - COCl$$

जलीय कॉपर(II) क्लोराइड विलयन के विद्युत्-अपघटन के दौरान कैथोड पर (a) 9. निम्नलिखित अभिक्रियाएँ होती हैं:

$$Cu^{2+}(aq) + 2e^{-} \longrightarrow Cu(s)$$
 $E^{0} = +0.34 \text{ V}$

$$\mathrm{H^{+}\,(aq)\ + e^{-} \longrightarrow }\ \frac{1}{2}\ \mathrm{H_{2}(g)}\qquad \mathrm{E^{0}=0.00\ V}$$

उनके मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव (E^0) के मानों के आधार पर कैथोड पर किस अभिक्रिया की संभावना (सुसंगतता) है और क्यों ?

(a) Following reactions occur at cathode during the electrolysis of aqueous copper(II) chloride solution:

$$Cu^{2+}(aq) + 2e^{-} \longrightarrow Cu(s)$$
 $E^{0} = +0.34 \text{ V}$

$$\label{eq:H+aq} \mathrm{H^{+}\,(aq)} \ + \mathrm{e^{-}} \longrightarrow \frac{1}{2} \ \mathrm{H_{2}(g)} \qquad \mathrm{E^{0}} = 0.00 \ \mathrm{V}$$

On the basis of their standard reduction electrode potential (E^0) values, which reaction is feasible at the cathode and why?

- (b) State Kohlrausch law of independent migration of ions. Write its one application.
- 10. संक्रमण तत्त्व क्यों परिवर्ती उपचयन अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं ? 3d श्रेणी में (Sc से Zn) कौन-सा तत्त्व सर्वाधिक उपचयन अवस्थाएँ दर्शाता है और क्यों ?

2

Why do transition elements show variable oxidation states? In 3d series (Sc to Zn), which element shows the maximum number of oxidation states and why?

11. 37.2 g जल में NaCl (मोल द्रव्यमान = 58.5 g mol^{-1}) की कितनी मात्रा घुलाई जाए कि हिमांक 2° C घट जाए, यह मानते हुए कि NaCl पूर्ण रूप से विघटित होता है ?

$$(K_f$$
 जल के लिए = $1.86 \text{ K kg mol}^{-1})$

3

Calculate the mass of NaCl (molar mass = $58.5~g~mol^{-1}$) to be dissolved in 37.2~g of water to lower the freezing point by $2^{\circ}C$, assuming that NaCl undergoes complete dissociation. (K_f for water = $1.86~K~kg~mol^{-1}$)

- (i) Indicate the principle behind the method used for the refining of Nickel.
- (ii) What is the role of dilute NaCN in the extraction of gold?
- (iii) What is 'copper matte'?

QB365-Question Bank Software 25°C पर निम्न सेल का विद्युत्-वाहक बल (ई.एम.एफ.) परिकलित कीजिए : **15.**

$$Zn \mid Zn^{2+} \ (0\cdot 001 \ M) \mid \mid H^{+} \ (0\cdot 01 \ M) \mid H_{2}(g) \ (1 \ bar) \mid Pt(s)$$

$$E^0_{(Zn^{\,2+}\,/\,Zn)}\,=-\,0.76\;V,\quad E^0_{(H^+\,/\,H^{\,}_2)}\,=0.00\;V$$

Calculate the emf of the following cell at 25°C:

$$Zn \mid Zn^{2+} (0.001 \text{ M}) \mid \mid H^{+} (0.01 \text{ M}) \mid H_{2}(g) (1 \text{ bar}) \mid Pt(s)$$

$$E^0_{(Zn^{\,2+}\,/\,Zn\,)} = -\,0.76\;V, \quad E^0_{(H^+\,/\,H_2)} = 0.00\;V$$

- निम्नलिखित अवलोकनों के लिए कारणों को दीजिए: 16.
 - समुद्री जल और नदी का जल जहाँ मिलते हैं वहाँ एक डेल्टा बन जाता है। (i)
 - चारकोल की सतह पर N_2 गैस की अपेक्षा NH_3 गैस अधिक शीघ्रता से अधिशोषित (ii) होती है।
 - चूर्ण किए हुए पदार्थ अधिक प्रभावशाली अधिशोषक होते हैं। (iii)

Give reasons for the following observations:

- A delta is formed at the meeting point of sea water and river (i) water.
- NH3 gas adsorbs more readily than N2 gas on the surface of (ii) charcoal.
- Powdered substances are more effective adsorbents. (iii)
- कॉम्प्लेक्स $[Pt(en)_2Cl_2]^{2+}$ के ज्यामितीय समावयवों को आरेखित कीजिए । 17. (i)
 - क्रिस्टल फील्ड सिद्धान्त के आधार पर यदि $\Delta_{
 m o} > {
 m P}$ है, तो ${
 m d}^4$ आयन का इलेक्ट्रॉनिक (ii) विन्यास लिखिए ।
 - कॉम्प्लेक्स [Ni(CN)4]2- का संकरण प्रकार और चुम्बकीय व्यवहार लिखिए । (iii) (Ni का परमाणु क्रमांक = 28)
 - Draw the geometrical isomers of complex $[Pt(en)_2Cl_2]^{2+}$. (i)
 - (ii) On the basis of crystal field theory, write the electronic configuration for d^4 ion, if $\Delta_0 > P$.
 - (iii) Write the hybridization type and magnetic behaviour of the complex $[Ni(CN)_4]^{2-}$. (Atomic number of Ni = 28)

3

3

QB365-Question Bank Software

QB365-Question Bank Software एल्किल हैलाइंडे जल में घुलनशील नहीं है । क्यों ? 18. (a) ब्युटैन-1-ऑल प्रकाशिकीय निष्क्रिय (ध्रवण अघूर्णक) है परन्त् ब्युटैन-2-ऑल (b) प्रकाशिकीय सिक्रय (ध्रवण घूर्णक) है । क्यों ? यद्यपि क्लोरीन इलेक्टॉन को आकर्षित करने वाला ग्रुप है फिर भी यह इलेक्टॉनस्नेही (c) एरोमैटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में *ऑर्थो*- तथा *पैरा*- निर्देशक है। क्यों ? 3 Why are alkyl halides insoluble in water? (a) Why is Butan-1-ol optically inactive but Butan-2-ol is optically (b) active? Although chlorine is an electron withdrawing group, yet it is (c) ortho-, para- directing in electrophilic aromatic substitution reactions. Why? निम्नलिखित का रूपांतरण आप कैसे करेंगे : 19. 3 बेन्जोइक एसिड को बेन्जैल्डिहाइड में (i) एथाईन को एथैनैल में (ii) ऐसीटिक एसिड को मीथेन में (iii) अथवा निम्नलिखित अभिक्रियाओं से सम्बन्धित समीकरणों को लिखिए : 3 स्टीफन अभिकिया (i) वोल्फ-किश्नर अपचयन (ii) एटार्ड अभिक्रिया (iii) How do you convert the following: (i) Benzoic acid to Benzaldehyde Ethyne to Ethanal (ii) (iii) Acetic acid to Methane OR. Write the equations involved in the following reactions: (i) Stephen reaction

QB365-Question Bank Software

(ii)

(iii)

Wolff-Kishner reduction

Etard reaction

- **QB365-Question Bank Software** निम्नलिखित को आप कारण देते हुए कैसे समझाएँगे : 20. (a)
 - m Mn का उच्चतम फ्लुओराइड $m MnF_4$ है जबिक उच्चतम ऑक्साइड $m Mn_2O_7$ (i) है ।
 - संक्रमण धातुएँ और उनके यौगिक उत्प्रेरक गुणधर्म दर्शाते हैं। (ii)
 - (b) निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए :

$$3 \operatorname{MnO}_4^{2-} + 4 \operatorname{H}^+ \rightarrow$$

- (a) How would you account for the following:
 - Highest fluoride of Mn is MnF₄ whereas the highest oxide is (i) Mn_2O_7 .
 - Transition metals and their compounds show catalytic (ii) properties.
- Complete the following equation: (b)

$$3 \operatorname{MnO}_4^{2-} + 4 \operatorname{H}^+ \rightarrow$$

निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों की प्रागुक्ति कीजिए 21.

(i)
$$CH_3 - CH = CH_2 \xrightarrow{i} \frac{B_2H_6}{ii} \xrightarrow{3 H_2O_2/OH^-} ?$$

(ii)
$$C_6H_5 - OH \xrightarrow{Br_2 (aq)} ?$$

(iii)
$$CH_3CH_2OH \xrightarrow{Cu/573 \text{ K}} ?$$

Predict the products of the following reactions:

(i)
$$CH_3 - CH = CH_2 \xrightarrow{i} \frac{B_2H_6}{ii} \frac{3 H_2O_2 / OH^-}{2}$$
?

(ii)
$$C_6H_5 - OH \xrightarrow{Br_2 (aq)} ?$$

(iii)
$$CH_3CH_2OH \xrightarrow{Cu/573 K} ?$$

3

22. एक तत्त्व X (मोलर द्रव्यमान = 60 g mol^{-1}) का घनत्व 6.23 g cm^{-3} है । यदि यूनिट सेल के कोर की लम्बाई $4 \times 10^{-8} \text{ cm}$ है, तो क्यूबिक यूनिट सेल के प्रकार की क्या पहचान होगी ?

An element X (molar mass = 60 g mol⁻¹) has a density of 6.23 g cm⁻³. Identify the type of cubic unit cell, if the edge length of the unit cell is 4×10^{-8} cm.

3

4

23. बच्चों में मधुमेह और उदासी के बढ़ते केसों को देखने के बाद एक प्रसिद्ध स्कूल के प्रिंसिपल श्री चोपड़ा ने एक सेमिनार का आयोजन किया जिसमें उन्होंने बच्चों के अभिभावकों तथा अन्य स्कूलों के प्रिंसिपलों को आमंत्रित किया । उन्होंने स्कूलों में सड़े हुए भोज्य पदार्थों (जंक फूड) पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, साथ ही यह निर्णय लिया कि स्कूलों में स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ जैसे सूप, लस्सी, दूध आदि कैंटीनों में उपलब्ध कराई जाएँ । उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि प्रात:कालीन एसेम्बली के समय बच्चों को प्रतिदिन आधे घंटे की शारीरिक कसरत भी कराई जाए । छ: माह पश्चात् श्री चोपड़ा ने बच्चों के स्वास्थ्य का अधिकतम विद्यालयों में पुन: निरीक्षण करवाया और बच्चों के स्वास्थ्य में अनुपम सुधार पाया गया ।

उपर्युक्त प्रकरण को पढ़ने के बाद, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) श्री चोपड़ा द्वारा किन मूल्यों (कम-से-कम दो) को दर्शाया गया है ?
- (ii) एक विद्यार्थी के रूप में, आ<mark>प इस विषय में कैसे जागरूकता फैलाएँगे</mark> ?
- (iii) अवनमन-विरोधी इग बिना डॉक्टर की सलाह के क्यों नहीं लेने चाहिए ?
- (iv) कृत्रिम मधुरक के दो उदाहरण दीजिए।

Seeing the growing cases of diabetes and depression among children, Mr. Chopra, the principal of one reputed school organized a seminar in which he invited parents and principals. They all resolved this issue by strictly banning the junk food in schools and by introducing healthy snacks and drinks like soup, lassi, milk etc. in school canteens. They also decided to make compulsory half an hour physical activities for the students in the morning assembly daily. After six months, Mr. Chopra conducted the health survey in most of the schools and discovered a tremendous improvement in the health of students.


After reading the above passage, answer the following questions:

- (i) What are the values (at least two) displayed by Mr. Chopra?
- (ii) As a student, how can you spread awareness about this issue?
- (iii) Why should antidepressant drugs not be taken without consulting a doctor?
- (iv) Give two examples of artificial sweeteners.
- 24. (a) निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए:
 - (i) सक्रियण ऊर्जा
 - (ii) दर स्थिरांक
 - (b) 25% वियोजन के लिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट लेती है । अभिक्रिया के लिए ${\rm t}_{1/2}$ का परिकलन कीजिए ।

(दिया गया : $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$, $\log 4 = 0.6021$)

अथवा

(a) एक रासायनिक अभिक्रिया $R \to P$ के लिए सांद्रण में परिवर्तन $\ln [R]$ vs. समय (s) नीचे प्लॉट में दिया गया है :



- (i) अभिक्रिया की कोटि की प्राग्ति कीजिए।
- (ii) वक्र का ढलान क्या है ?
- (iii) अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की यूनिट लिखिए।
- (b) दर्शाइए कि 99% पूर्ण होने में जो समय लगता है वह उस समय का दुगुना है जो अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगता है।

5


(a) Define the following terms:

- (i) Activation energy
- (ii) Rate constant
- (b) A first order reaction takes 10 minutes for 25% decomposition. Calculate $\rm t_{1/2}$ for the reaction.

(Given: $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$, $\log 4 = 0.6021$)

OR

(a) For a chemical reaction $R \to P$, the variation in the concentration, ln [R] vs. time (s) plot is given as



- (i) Predict the order of the reaction.
- (ii) What is the slope of the curve?
- (iii) Write the unit of rate constant for this reaction.
- (b) Show that the time required for 99% completion is double of the time required for the completion of 90% reaction.
- 25. (a) निम्नलिखित के कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए :
 - (i) NH_4^+ में जो आबन्ध कोण है वह NH_3 के कोण से उच्चतर है।
 - (ii) H_2O की अपेक्षा H_2S का क्वथनांक न्यूनतर है ।
 - (iii) अपचयन व्यवहार SO_2 से TeO_2 की ओर घटता है ।
 - (b) निम्नलिखित की संरचनाएँ आरेखित कीजिए:
 - (i) $H_4P_2O_7$ (पायरोफॉस्फोरिक ऐसिड)
 - (ii) XeF_2

(a)	निम्ना	<i>QB365-Question Bank Software</i> लेखित की संरचनाएँ आरेखित कीजिए :
	(i)	XeF_4

(b) निम्नलिखित के कारण दीजिए :

 $H_2S_2O_7$

(ii)

- (i) HCl से अभिक्रिया से आयरन $FeCl_2$ बनाता है न की $FeCl_3$.
- (ii) HClO की अपेक्षा HClO4 प्रबलतर अम्ल है।
- (iii) वर्ग 15 के सभी हाइड्राइडों में ${
 m BiH_3}$ प्रबलतम अपचायक है ।

(a) Account for the following:

- (i) Bond angle in NH₄ is higher than NH₃.
- (ii) H_2S has lower boiling point than H_2O .
- (iii) Reducing character decreases from SO₂ to TeO₂.
- (b) Draw the structures of the following:
 - (i) $H_4P_2O_7$ (Pyrophosphoric acid)
 - (ii) XeF₂

OR

- (a) Draw the structures of the following:
 - (i) XeF_4
 - (ii) $H_2S_2O_7$
- (b) Account for the following:
 - (i) Iron on reaction with HCl forms FeCl₂ and not FeCl₃.
 - (ii) HClO₄ is a stronger acid than HClO.
 - (iii) BiH₃ is the strongest reducing agent amongst all the hydrides of group 15.

- **26.** (a) प्रत्येक के लिए उपयुक्त उदाहरण देते हुए निम्नलिखित अभिक्रियाओं को प्रदर्शित कीजिए :
 - (i) अमोनीकरण
 - (ii) कप्लिंग (युग्मन) अभिक्रिया
 - (iii) ऐमीनों का ऐसीटिलीकरण
 - (b) प्राथमिक (प्राइमरी), द्वितीयक (सेकण्डरी) और तृतीयक (टर्शियरी) एमीनों की पहचान करने के लिए हिन्सबर्ग विधि का वर्णन कीजिए। सम्बद्ध अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरणों को भी लिखिए।

अथवा

- (a) जब बेन्ज़ीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड ($C_6 H_5 N_2^+ Cl^-$) निम्नलिखित अभिकारकों से अभिक्रिया करता है, तब प्राप्त मुख्य उत्पादों की संरचनाएँ लिखिए :
 - (i) HBF_{4} / Δ
 - (ii) Cu/HBr
- (b) निम्नलिखित अभिक्रियाओं में A, B और C की संरचनाएँ लिखिए:

(i)
$$C_6H_5NO_2 \xrightarrow{Sn/HCl} A \xrightarrow{NaNO_2 + HCl} B \xrightarrow{H_2O} C$$


(ii)
$$CH_3Cl \xrightarrow{KCN} A \xrightarrow{LiAlH_4} B \xrightarrow{HNO_2} C$$

5 K 5

- (a) Illustrate the following reactions giving suitable example in each case:
 - (i) Ammonolysis
 - (ii) Coupling reaction
 - (iii) Acetylation of amines
- (b) Describe Hinsberg method for the identification of primary, secondary and tertiary amines. Also write the chemical equations of the reactions involved.

- (a) Write the structures of main products when benzene diazonium chloride ($C_6 H_5 N_2^+ Cl^-$) reacts with the following reagents :
 - (i) HBF_4 / Δ
 - (ii) Cu/HBr
- (b) Write the structures of A, B and C in the following reactions:

$$\text{(i)} \quad \text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 \ \xrightarrow{\text{Sn}\,/\,\text{HCl}} \ \text{A} \ \frac{\text{NaNO}_2 + \text{HCl}}{273 \ \text{K}} \!\!\!\! \rightarrow \ \text{B} \ \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \!\!\!\! \Delta \!\!\!\! \rightarrow \ \text{C}$$



CHEMISTRY MARKING SCHEME 2015 SET -56/2/1 F


Qn	Value points	Marks
1	CH ₃ CH ₂ I, because I is a better leaving group.	1/2 , 1/2
2	Rhombic sulphur	1
3	3-Methylbut-2-en-1-ol	1
4	X_2Y_3	1
5	Because of weak van der Waals' forces in physisorption whereas there are strong chemical forces in chemisorption.	1
6.	i) tris-(ethane-1,2-diamine)chromium(III) chloride	1
	ii) K ₃ [Cr(C ₂ O ₄) ₃]	1
7.	When solute- solvent interaction is stronger than pure solvent or solute interaction.	1
	Eg: chloroform and acetone (or any other correct eg)	1/2
	ΔmixH= negative	1/2
	OR ON	
7.	Azeotropes -binary mixtures having same composition in liquid and vapour phase and boil at	1
	constant temperature / is a liquid mixture which distills at constant temperature without	
	undergoing change in composition	1/2
	Maximum boiling azeotropes	1/2
	eg: HNO ₃ (68%) and H ₂ O(32%) (or any other correct example)	
8.	(i) CH ₃ MgBr/ H ₃ O ⁺	1
	(ii) PCl ₅ / PCl ₃ / SOCl ₂	1
9.	a) Cu^{2+} (aq) + 2 e \longrightarrow Cu(s) because of high E^0 value/ more negative ΔG	1/2 , 1/2
	b) It states that limiting molar conductivity of an electrolyte is equal to the sum of the individual	1
	contributions of cations and anions of the electrolyte.	
	It is used to calculate the Λm^0 for weak electrolyte / It is used to calculate α and Kc	
	(Any one application)	1


10	a) Due to presence of unpaired d-electrons/ comparable energies of 3d and 4s orbitals.b) Mn, due to involvement of 4s and 3d electrons/ presence of maximum unpaired d-electrons.	1 1/2 ,1/2
11	$\Delta T_f = i. K_f m$	
	$= i K_f w_B x 1000$	1
	$M_{\mathrm{B}} \times W_{\mathrm{A}}$	
	$2K = 2 \times 1.86K \text{ kg/mol } \times \text{ w}_{B} \times 1000$	1
	58.5 g/mol x 37.2 g	
	$\mathbf{w_B} = 1.17\mathbf{g}$	1
12	n HOH₂C - CH₂OH + n HOOC — COOH	
	Ethylene glycol Terephthalic acid (Ethane-1, 2 - diol) (Benzene-1, 4 - di carboxylic acid)	1
	i) OH +CH ₂ O ii) Phenol and formaldehyde	1
	CH ₂ = CH - CH = CH ₂ C ₆ H ₅ CH=CH ₂ 1, 3-Butadiene (Note: half mark for structure/s and half mark for name/s)	1
13	i) Fructose	1
	ii) Acidic amino acid has more number of acidic carboxylic group than basic amino group whereas basic amino acid has more number of basic amino group.	1
	iii) Vitamin C	1
14	a) Impure Ni reacts with CO to form volatile Ni(CO) ₄ which when heated at higher	1
	temperature decomposes to give pure Ni.	
	b) NaCN acts as a leaching agent to form a soluble complex with gold.	1
	c) It is a mixture of Cu ₂ S and FeS	1


15	E cell = E^0 cell - $\frac{0.059}{n}V$ log $\frac{[Zn^{2+}]}{[H^+]_2}$	1
	E cell = $0.76 \text{ V} - \frac{0.059}{2} \text{ V log} = \frac{10^{-3}}{(10^{-2})^2}$	1
	$E \text{ cell} = 0.76 - 0.0295 \text{ V} \log 10$	
	= 0.7305 V	1
16	Due to coagulation of colloidal clay particles.	1
	ii) Because NH ₃ is easily liquefiable than N ₂ due to its larger molecular size.	1
	iii) Because of more surface area.	1
1.77		
17	en Pt en Cl en Cl cis- isomer trans-isomer	1
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1
	iii) dsp ² , diamagnetic	1/2 , 1/2
18	a) Because they are unable to form H-bonds with water molecules.	1
	b) Because of the presence of chiral carbon in butan-2-ol.	1
19	c) Due to dominating +R effect i) C ₆ H ₅ COOH PCl ₅ C ₆ H ₅ COCl H ₂ /Pd C ₆ H ₅ CHO	1
19	—	1
	BaSO_4	
	ii) $CH \equiv CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}/H_2SO_4} CH_3CHO$	1
	iii) CH ₃ COOH NaOH CH ₃ COONa NaOH + CaO, heat CH ₄	1
	OR	
19.	$RCN + SnCl_2 + HCl \longrightarrow RCH = NH \xrightarrow{H_3 \stackrel{t}{O}} RCHO$	1
	$C = O \xrightarrow{NH_2NH_2} C = NNH_2 \xrightarrow{KOH/\text{ethylene glycol}} CH_2 + N_2$ ii)	1
	$ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ + \text{CrO}_2\text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{CS}_2} \end{array} \begin{array}{c} \text{CH(OCrOHCl}_2)_2 \\ \xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^*} \end{array} \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \end{array} $	1

20	i) Because oxygen stabilizes Mn more than F due to multiple bonding	1
	ii) Because of their ability to show variable oxidation state(or any other correct reason)	1
	iii) $3MnO_4^{2-} + 4H^+ \rightarrow 2MnO_4^- + MnO_2 + 2H_2O$	1
21	i) CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH	1
	Br I Pr	
	$^{\mathrm{Br}}$	
		1
	::\ Br	
	ii) Br	
	iii) CH ₃ CHO	1
22		1/
22	$d = \frac{Z \times M}{N_a \times a^3}$	1/2
	$6.23 \text{ g cm}^{-3} = \frac{z \times 60 \text{ g/mol}}{6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (4 \times 10 - 8cm)^3}$	1/
	$6.022 \times 10^{-5} \text{ mot } - \chi (4 \times 10^{-6} \text{cm})^{-5}$	1/2
	363	
	z=4	1
	fcc	1
23	a) Concern for students health, Application of knowledge of chemistry to daily life, empathy , caring or any other	1/2 , 1/2
	b) Through posters, nukkad natak in community, social media, play in assembly (or any other	
	relevant answer)	1
	c) Wrong choice and overdose may be harmful	1
	d) Aspartame, saccharin (or any other correct example)	1/2+ 1/2
24	a)i) Activation energy- Extra energy required by reactants to form activated complex.	1
	ii) Rate constant- rate of reaction when the concentration of reactant is unity.	1
	,	
	b)	
	1- 2 202 100 [A]	1/2
	$k = \underbrace{2.303}_{t} \log \left[\underbrace{A_0}_{A} \right]$	
	· [/*]	
	$k = 2.303 \log 100$	1/2
	10 min 75	72
	$k = 2.303 \times 0.125$	
	$\frac{10 \text{ min}}{10 \text{ min}}$	

	$k = 0.02879 \text{ min}^{-1}$	1
	$t_{1/2} = \frac{0.693}{k} = \frac{0.693}{0.02879 min^{-1}}$	
	$t_{1/2} = 24.07 min$	1
24.	OR	
24.	a) i)First order ii) -k iii) s ⁻¹	
	b)	1,1,1
	$t = \frac{2.303}{k} \log \frac{[R]0}{[R]}$	
	$t_{99\%} = \frac{2.303}{k} \log \frac{100}{1}$	1/2
	$t = \frac{2.303}{k} \times 2$	72
	$t_{90\%} = \frac{2.303}{k} \log \frac{100}{10}$	1/2
	$=\frac{2.303}{k}$	
	$t_{99\%} = 2 \times t_{90\%}$	1
25	a) i)Because of lone pair in NH ₃ , lone pair-bond pair repulsion decreases the bond angle	1
	ii)Because of absence of H-bonding in H ₂ S	1
	iii)Because stability of +4 oxidation state increases from SO ₂ to TeO ₂	1
	HO OH OH	1,1
	b) H ₄ P ₂ O ₇	
	OR	
]







		_		
Cr	Name	Er	 Name	1
3F.		1 31.		

No.	No).	

